


# SPĀNIJAS KAILGLIEMEZIS (ARION VULGARIS SIN. ARION LUSITANICUS)



Ķermeņa garums var sasniegt 7-15 cm. Krāsa ļoti mainīga – no spilgti oranžas līdz tumši pelēkai. Biežāk sastopami brūngani īpatņi. Gļotas ir biezas un grūti nomazgājamas. Polifāgs (visēdājs), taču pamatā barojas ar augiem. Raksturīgs arī kanibālisms. Dzīves ilgums – viens gads. Viendzimuma dzīvnieks (hermafrodīts). Aktīvs naktī. Lauksaimniecības kaitēklis. **Viens īpatnis sezonā izdēj 250 – 500 olas!**





Kailgliemeži var pārnēsāt *Escherichia coli* un *Clostridium botulinum* baktērijas; tie ir starpsaimnieks vairākām parazītu sugām (nematodēm) - tāpēc pārtikā nav ieteicams lietot zaļumus un augļus, kurus klāj gliemežu gļotas. Pārnēsā arī augu patogēnus. No beigtiem gliemežiem izdalās toksiskas vielas, kas var radīt alerģiskas reakcijas

Latvijā ieeļoja ar cilvēka palīdzību – ar kravām, piemēram, baļķu kravām, ar augsni, kompostu un augiem



Masveidā savairojoties, rada zaudējumus dārzu un augļu audzētājiem, iznīcinot > nekā 50% ražas, bet iekļūstot skābsienā, bojā tā kvalitāti un garšu un palielina liellopiem risku saslimt ar botulismu



Kailgliemeži apgrauž uz zemes vai krūmos ligzdojošo zvirbuļveidīgo putnu mazuļus



Latvijā *A. vulgaris* pirmo reizi tika konstatēts 2009. gadā Pastendē. Pašlaik suga ir apstiprināta 46 vietās Latvijā

Kailgliemežu pārošanās

No oliņām izšķīlušies mazuļi