

BROILERI (EKSTENSĪVI)

Krišana – 5%	Mēr– vienība	Ekstensīvi		
		Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR
IEŅĒMUMI				
Brāķētie putni (dzīvsvars)	kg	3,0	5,00	15,00
Jaunputna (cāļa) iegāde	gab.	-1,00	1,50	-1,50
Kūtsmēsli	kg	4,50	0,02	0,09
KOPĀ (1)				13,59
MAINĪGĀS IZMAKSAS				
IZEJVIELU IZMAKSAS				
Barība 0-10 dienai	kg	0,248	0,96	0,24
Barība 11-24 dienai	kg	0,742	0,91	0,68
Barība 25-34 dienai	kg	0,990	0,89	0,88
Miežu milti 25-34 dienai	kg	0,100	0,165	0,02
Barība 35-55 dienai	kg	1,932	0,83	1,60
Miežu milti 35-55 dienai	kg	0,150	0,165	0,02
Ganību zāle	kg	0,500	0,010	0,005
Elektrība	kWh	0,04	0,17	0,01
Pakaiši (kūdra)	litri	5,0	0,03	0,17
Citas mainīgās izmaksas	eiro			0,74
KOPĀ (2)				4,36
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS				
Algotais darbs	h	0,55	10,21	5,61
KOPĀ (3)				5,61
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				9,98
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi-izejvielu izmaksas)				9,23
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi-kopā mainīgās izmaksas)				3,62

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas un saimniecību sniegtie dati.

Izstrādātais vistu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas saskaņā ar ekspertu viedokli ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu. Aprēķini veikti, pieņemot, ka saimniecībā ir ROS308 šķirne un 50 broileru ganāmpulks.

Cālēni tiek iepirkti diennakts vecumā. Līdz 25 dienai tos audzē ar sildlampu apsildāmās telpās. Pēc 25 dienas broileri tiek pārvietoti uz ganību aploku (4m x 6m), kur tie neierobežotā daudzumā patērē ganību zāli.

Sākumā putni tiek baroti ar kombinēto barību, bet vēlāk papildus tiek baroti ar miežu miltiem. Putni tiek baroti 50 līdz 60 dienas, līdz sasniedz 3 kg dzīvmasu.

Citas mainīgās izmaksas sevī ietver novietnes dezinfekcijas līdzekli un vitamīnus.

Algotā darbaspēka izmaksu aprēķinā piemērota Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā bruto vidējā stundu tarifa likme putnkopjiem 2024. gadā. Likmē iekļauts darba devēja VSAOI.

Sastādītais bruto segums pamatojas uz ilggadīgu audzēšanas pieredzi, bet to nevar uzskatīt par universālu un kategorisku. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāveic korekcijas atbilstoši saimniekošanas tehnoloģijai un apstākļiem (barības devas, sastāvs u. c.).